

# دواء زيلازين

## معلومات أساسية

### الجرعة الزائدة ودواء نالوكسون

إذا ظهر على شخص ما تناول جرعة زائدة، اتصل على الرقم 911 وقم بإعطائه دواء نالوكسون على الفور. يُعد دواء زيلازين مادة غير أفيونية. نظرًا لأنه عادة ما يتم خلط دواء زيلازين بالمواد الأفيونية، قد تبدو الجرعة الزائدة منه مشابهة للجرعة الزائدة من المواد الأفيونية، بما في ذلك، صوت الشخير أو إبطاء معدل ضربات القلب أو إبطاء/انقطاع التنفس أو عدم الاستجابة. سيساعد دواء نالوكسون في أثر تعاطي الجرعة الزائدة ولكن ستكون هناك حاجة لتلقي الرعاية الداعمة للآثار الجانبية لدواء زيلازين، وهو ما يُفسر ضرورة الاتصال على الرقم 911.

## ما دواء زيلازين؟

- يُعد الزيلازين، والذي يُعرف أيضًا باسم ترانك أو مخدر ترانك مادة غير أفيونية، ومهدئ بيطري، يُضاف على المخدرات غير المشروعة.
- يمكن تناول الزيلازين عن طريق الفم أو الاستنشاق عبر الأنف أو التدخين أو الحقن.
- يضاف الزيلازين إلى المخدرات لرخصه وإتاحته وتعزيزه من تأثير المواد الأخرى.
- يضاف الزيلازين بشكل ملحوظ إلى المواد التي تحتوي على الفنتانيل، كما تم رصده في عقاقير أخرى ومنها الكوكايين والميثامفيتامين.
- يتناول العديد من الأشخاص الزيلازين دون علم لأنه يضاف إلى العقاقير الأخرى.

## ما الآثار الجانبية الأساسية لتناول الزيلازين؟

- يحتوي دواء الزيلازين على تأثيرات مهدئة يمكن أن تستمر لعدة ساعات، وغالبًا ما يستمر مفعول التخدير من دواء الزيلازين فترة أطول من مفعول المواد التي يتم خلطها معه.
- قد يسبب تناول دواء الزيلازين انخفاض ضغط الدم أو تباطؤ معدل ضربات القلب أو التهاب الجلد والأنسجة الرخوة ويكون أكثر شيوعًا في الأطراف مثل الساعدين والساقين
- يمكن أن يؤدي تناول دواء الزيلازين إلى زيادة التخدير وتثبيط الجهاز التنفسي، ومن ثم زيادة خطر الإصابة بجرعة زائدة عند خلطه مع مثبطات الجهاز العصبي المركزي الأخرى (لا سيما، الفنتانيل والبنزوديازيبينات والكحول).
- يمكن أن يسبب تناول الزيلازين إصابات في الأعصاب والعضلات نتيجة أطول فترة التخدير وبقاء الأشخاص في وضع التخدير لعدة ساعات.

## المصادر

اتصل على الرقم 911 للمساعدة العاجلة للجرعة الزائدة

للمزيد من المعلومات بشأن الحد من الضرر وإستراتيجيات الحد من الضرر، يمكنك زيارة التحالف الوطني للحد من الضرر (انظر الرابط) اتصل على

الرقم 8-8-9 أو على خط الوصول والأزمات على الرقم 888-742-7240 للتحدث مع أحد الاستشاريين المتمرسين

اتصل على الرقم 1-2 للمساعدة في العثور على الموارد المحلية التي تشمل دواء نالوكسون وشرائط اختبار الفنتانيل والعلاج بمساعدة الأدوية (MAT)



SUBSTANCE USE AND  
OVERDOSE PREVENTION  
TASKFORCE



Center for  
Community  
Research