

# زایلازین

## پیام کلیدی

### مصرف بیش از حد و نالوکسان

اگر فردی به نظر می‌رسد که بیش از حد مصرف می‌کند، با 911 تماس بگیرید و نالوکسان را در اسرع وقت تجویز کنید. زایلازین یک اپیوئید نیست. از آنجایی که زایلازین معمولاً با مواد افیونی مخلوط می‌شود، مصرف بیش از حد زایلازین ممکن است شبیه به مصرف بیش از حد مواد افیونی باشد، از جمله خروپف، ضربان قلب آهسته، کاهش/فقدان تنفس یا عدم پاسخگویی. نالوکسان به مصرف بیش از حد مواد افیونی کمک می‌کند، اما مراقبت‌های حمایتی برای اثرات زایلازین مورد نیاز است، به همین دلیل است که تماس با 911 بسیار مهم است.

## زایلازین چیست؟

- زایلازین که با نام ترانک یا ترانک دوپ نیز شناخته می‌شود، یک آرام‌بخش دامپزشکی غیرافیونی است که به عنوان افزودنی در عرضه مواد مخدر غیرقانونی استفاده می‌شود.
- زایلازین را می‌توان به صورت خوراکی، استنشاقی یا استنشامی، دودی یا تزریقی مصرف کرد.
- زایلازین به دلیل ارزان بودن، به دست آوردن آسان و افزایش اثر سایر مواد، به مواد دارویی اضافه می‌شود.
- زایلازین به طور قابل توجهی به محصولات حاوی فنتانیل اضافه می‌شود، اگرچه در داروهای دیگر از جمله کوکائین و مت‌آمفتامین مشاهده شده است.
- بسیاری از افراد ناآگاهانه از زایلازین استفاده می‌کنند، زیرا به داروهای دیگر اضافه می‌شود.

## اثرات عمده استفاده از زایلازین چیست؟

- زایلازین اثر آرام بخشی دارد که می‌تواند چندین ساعت باقی بماند. آرام‌بخشی زایلازین اغلب از اثرات موادی که با آن مخلوط می‌شود بیشتر است.
- زایلازین ممکن است باعث کاهش فشار خون، کند شدن ضربان قلب و عفونت پوست یا بافت نرم شود که معمولاً در اندام‌هایی مانند ساعد و پاها رخ می‌دهد.
- در ترکیب با سایر داروهای تضعیف سیستم عصبی مرکزی (به ویژه فنتانیل، بنزودیازپین‌ها و الکل)، استفاده از زایلازین می‌تواند آرام بخشی و دپرسیون تنفسی را افزایش دهد و خطر مصرف بیش از حد را افزایش دهد.
- به دلیل آرام‌بخشی طولانی مدت و قابل توجه، زایلازین می‌تواند باعث آسیب‌های عصبی و عضلانی در نتیجه ماندن افراد در همان موقعیت در طی چندین ساعت شود.

## منابع

برای دریافت کمک فوری در صورت مصرف بیش از حد با 911 تماس بگیرید

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کاهش آسیب و راهبردهای کاهش آسیب، به ائتلاف ملی کاهش آسیب مراجعه کنید (پیوند شده) با شماره 8-8-9 یا خط دسترسی و بحران به شماره 888-742-7240 تماس بگیرید تا با یک مشاور آموزش دیده صحبت کنید. برای کمک به یافتن منابع محلی از جمله نالوکسان، نوارهای آزمایش فنتانیل و درمان MAT با شماره 1-1-2 تماس بگیرید.



SUBSTANCE USE AND  
OVERDOSE PREVENTION  
TASKFORCE



Center for  
Community  
Research