



Información sobre el Fentanilo para Profesionales Médicos

¿Qué es el fentanilo y como actúa en el cuerpo?

El fentanilo es un poderoso opioide sintético similar a la morfina, pero de 50 a 100 veces más potente. En forma de prescripción médica, se receta para el dolor, pero el fentanilo también se fabrica ilegalmente y se distribuye como droga de la calle. El fentanilo ilegal se vende en forma de polvo o se produce como píldoras que parecen opioides recetados auténticos (analgésicos).

El fentanilo actúa uniéndose a los receptores del cuerpo que se encuentran en las áreas del cerebro que controlan el dolor y las emociones. Sus efectos incluyen euforia, somnolencia, náuseas, confusión, estreñimiento, sedación, tolerancia, adicción, depresión y paro respiratorio, inconsciencia, coma y muerte.



¿Por qué es un problema el fentanilo en San Diego?

El fentanilo es la sustancia más común encontrada en las muertes por sobredosis en San Diego – adolescentes de hasta 14 años han sufrido sobredosis y han muerto.

El fentanilo ilegal está siendo mezclado con otras drogas, como la cocaína, la heroína y la metanfetamina. Esto es especialmente peligroso porque las personas a menudo no saben que se agregó fentanilo. La alta potencia del fentanilo aumenta enormemente el riesgo de sobredosis, especialmente si alguien que consume drogas no sabe que un polvo o una pastilla lo contiene. La naloxona es un medicamento que se puede administrar a una persona para contrarrestar una sobredosis de fentanilo. Pueden ser necesarias múltiples dosis de naloxona debido a la alta potencia del fentanilo.



¿Qué puede hacer usted?

Hable | Converse con los pacientes y los padres sobre los riesgos de salud asociados con el consumo de sustancias. Informe a los padres que hay pastillas falsificadas accesibles a los jóvenes que contienen fentanilo, una droga mortal. Recuérdeles a los pacientes que jamás tomen una pastilla que no haya sido recetada específicamente para ellos.

Evalúe | La Academia Estadounidense de Pediatría (AAP) actualizó su informe clínico sobre la importancia de realizar pruebas de detección de sustancias en los jóvenes. Este informe ofrece un enfoque clínico simplificado de SBIRT (*Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment*) para adolescentes. Junto con la declaración actualizada de políticas que le acompaña, este enfoque guía a los pediatras en la implementación de prácticas de prevención, detección, evaluación e intervención de sustancias en los distintos entornos clínicos en los que los adolescentes reciben atención médica.

Trate el trastorno del consumo de opioides en pacientes adolescentes. | Se ha comprobado que medicamentos junto con terapias conductuales son eficaces para tratar a quienes padecen de adicción al fentanilo y otros opioides. La Academia Estadounidense de Pediatría aboga por aumentar los recursos para mejorar el acceso al tratamiento con medicamentos a los

adolescentes y adultos adictos a los opioides. Además, la AAP recomienda que los pediatras consideren ofrecer tratamiento con medicamentos a sus pacientes jóvenes y adolescentes que padecen de trastornos graves del consumo de opioides o que ofrezcan referirlos a otros proveedores para este servicio. Si le preocupa el consumo de opioides o fentanilo de un paciente, comparta la **Línea de Acceso y Crisis del Condado de San Diego (888) 724-7240** para obtener más información sobre opciones de tratamiento y consejería.

Actúe | En casos de pacientes con trastornos graves del consumo de opioides, converse sobre la importancia de tener naloxona, un fármaco para contrarrestar opioides en caso de sobredosis. La naloxona puede comprarse en las farmacias de San Diego sin receta médica o conseguirse gratis a través de organizaciones de prevención. La naloxona es fácil de administrar y puede salvar vidas. Para encontrar naloxona cerca de usted, visite sdpdf.org. Siempre llame al 911 si se produce una sobredosis.

